UE8 CIRCULATION - MÉTABOLISMES

ITEM 256**PROTÉINURIE ET SYNDROME NÉPHROTIQUE CHEZ L'ADULTE ET CHEZ L'ENFANT** ÉCOUTER
DANS L'APP 36'**OBJECTIFS**

- ▶ **DEVANT LA DÉCOUVERTE D'UNE PROTÉINURIE**, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.
- ▶ **DEVANT UN SYNDROME NÉPHROTIQUE** chez l'enfant ou chez l'adulte, argumenter les hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.
- ▶ Argumenter les principes du traitement symptomatique et de la surveillance du syndrome néphrotique et de ses complications.

POINT CLÉS**DÉFINITION DU SYNDROME NÉPHROTIQUE**

PROTÉINURIE > 3 g/j (50 mg/kg/j chez l'enfant) et **albuminémie** < 30 g/L.

COMPLICATIONS AIGUËS ET LEUR TRAITEMENT

- ▶ **1. La RÉTENTION HYDROSODÉE**, caractérisée par une prise de poids, des œdèmes déclives, éventuellement une anasarque.
 - ▶ **Traitement** : régime sans sel ± diurétique.
- ▶ **2. L'INSUFFISANCE RÉNALE** aiguë
 - ▶ **Fonctionnelle par hypovolémie** :
 - ♦ due à la baisse de la volémie par fuite d'albumine vers le secteur interstitiel (rare) ;
 - ♦ ou déplétion hydrosodée brutale par diurétique.
 - ▶ **Organique** :
 - ♦ par nécrose tubulaire aiguë ;
 - ♦ par thrombose veineuse rénale.
- ▶ **3. LES THROMBOSES VASCULAIRES**
 - ▶ **Thrombose veineuse ou artérielle** chez l'enfant
 - ▶ **Maladie thromboembolique veineuse** chez l'adulte

▶ **Thrombose de veine rénale au cours de la glomérulonéphrite extra-membraneuse**♦ **Traitement curatif** :

- anticoagulant en cas de thrombose veineuse, prolongé aussi longtemps que le SN persiste, avec un objectif d'INR entre 2 et 3 ;
- anticoagulant et/ou aspirine si thrombose artérielle ;

♦ **Prophylaxie** :

- éviter l'immobilisation prolongée ;
- éviter la déplétion hydrosodée brutale (> 1 kg/j chez l'adulte) ;
- discuter un AVK si hypoalbuminémie profonde (< 20 g/L) et durable.

▶ **4. LES INFECTIONS BACTÉRIENNES À GERMES**

ENCAPSULÉS (pneumocoques, streptocoques ou BGN) : pneumopathie, péritonite, érysipèle ; pas d'indication à une antibioprophylaxie.

COMPLICATIONS CHRONIQUES ET LEUR TRAITEMENT

- ▶ **1. L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE**, favorisée par l'hypertension artérielle et une protéinurie massive persistante par échec ou absence de traitement spécifique
 - ▶ **Traitement «néphroprotecteur** » :
 - ♦ **Objectif tensionnel** : PA < 130/80 ; moyens : IEC + diurétique ;
 - ♦ **Réduire la protéinurie** : objectif < 0,5 g/j ; moyens : abaisser la PA + IEC (ou ARAII chez le diabétique de type 2) + régime peu salé + diurétique.
- ▶ **2. LA DYSLIPIDÉMIE ATHÉROGÈNE** (LDL-C élevé, hyperTG) :
 - ▶ Traitement par régime (peu efficace) et statine si SN durable (> 6 mois).

Abonnez-vous

Abonnez-vous et profitez immédiatement de la totalité de nos contenus !