UE4 PERCEPTION - SYSTÈME NERVEUX - REVÊTEMENT CUTANÉ

ITEM 88
PATHOLOGIE DES GLANDES SALIVAIRES

ÉCOUTER DANS L'APP 92'

Les glandes salivaires produisent la salive, et on distingue :

Les glandes salivaires accessoires (microscopiques) qui tapissent la muqueuse buccale

Les glandes salivaires principales (macroscopiques), qui forment 3 paires :

- Les glandes submandibulaires (ou sous-maxillaires) déversent la salive dans la bouche par l'intermédiaire du canal de Wharton.
- Les glandes sublinguales
- Les glandes parotides, les plus grosses, qui sont situées de chaque côté du visage au-dessous et en avant des oreilles. Elles déversent la salive au niveau de la joue par le canal de Sténon

INTRODUCTION

Les glandes salivaires peuvent être le siège de différentes affections, de nature :

- Infectieuse
- Lithiasique
- Tumorale
- Ou Immunologique

On appelle **sialite** l'inflammation d'un organe salivaire, et **sialose** son hypertrophie

ANATOMIE, HISTOLOGIE, PHYSIOLOGIE ÉLÉMENTAIRES DES GLANDES ORALES (OU SALIVAIRES)

Les glandes orales ou salivaires sont des glandes exocrines annexées à la cavité orale qui sécrètent la **salive**. La salive est une sécrétion aqueuse **hypotonique** par rapport au plasma, **riche en enzymes** (amylase, lysozyme) et en **anticorps**, et au pH légèrement acide, réalisant un volume journalier d'environ 1 à 1,5 litre.

Du point de vue histologique, chaque glande possède un **parenchyme sécréteur** et des canaux excréteurs.

La sécrétion des glandes principales est **discontinue**, répondant à un **contrôle mixte sympathique et surtout parasympathique**, induit par des **stimulus olfactif, visuel, gustatif ou neuropsychique.**

La sécrétion des petites glandes accessoires est **continue** et soumise à un **contrôle local**.

GLANDE DU COLLIER SALIVAIRE

GLANDE PAROTIDE (SALIVE SÉREUSE)

La glande parotide appartient au cou, et est **la plus volumineuse des glandes salivaires, et pèse 25 g.**

De forme prismatique, elle **se moule en arrière du ramus mandibulaire et sur les parois de la loge parotidienne** qui contient la **glande** mais aussi des **éléments vasculonerveux**, notamment le **nerf facial** qui délimite le lobe superficiel (volumineux) du lobe profond (peu développé). Elle est innervée par le nerf auriculotemporal, via le nerf glossopharyngien.

Elle est composée de **cellules sécrétoires séreuses**. Son canal excréteur, le canal de **Sténon**, chemine dans la paroi jugale pour s'ouvrir en regard de la deuxième molaire supérieure.

LOGE PAROTIDIENNE

La loge parotidienne est limitée par plusieurs parois, antérieure, postérieure, latérale, supérieure et postérieure, que nous allons décrire :

- **LA PAROI ANTÉRIEURE** est constituée (de dehors en dedans) par :
  - Le **ramus** mandibulaire,
  - Le muscle **masséter,**
  - La partie inférieure du muscle **stylo-glosse.**
  - Le muscle **ptérygoïdien médial**, qui est un muscle diducteur

La glande parotide a également un **PROLONGEMENT LATÉRO-MASSÉTÉRIN** recouvrant de façon variable ce muscle.

Abonnez-vous

Abonnez-vous et profitez immédiatement de la totalité de nos contenus !